LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE **USAR EL PRODUCTO**

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar el envase antes de verter su contenido al estanque de fertirriego o al estanque de la maguina aplicadora en el caso de aplicaciones planta por planta. Llenar primero el equipo aplicador con aqua a 2/3 de su capacidad, agregar y disolver el producto, finalmente completar con agua el volumen total de la capacidad de la máquina. Una vez preparada la solución debe ser inmediatamente aplicada al cultivo.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los productos de uso común, no se recomienda utilizar en conjunto con derivados cúpricos, aceites minerales o azufre. Para mayor seguridad recomendamos realizar pruebas de compatibilidad antes de mezclar con otros productos agroquímicos.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco, ventilado y sin exposición a la radiación solar.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos y la piel lavar con abundante agua. En caso de ser ingerido contactar con el médico y dar tratamiento sintomático

CARENCIA

no tiene restricciones.

PRECAUCIONES

No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios. No reutilice este envase.

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

En caso de derrame, lavar con aqua y usar el drenaje común. Si escurre al suelo diluir con agua.

En caso de intoxicación, mostrar la etiqueta o envase al personal de salud. Los envases inutilizarlos y eliminarlos de acuerdo a las instrucciones de las autoridades competentes. No trasportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipos de aplicación en lagos ríos y otras fuentes de agua.

> En caso de intoxicación o ingesta accidental llame a: CITUC Toxicológico: +56 2 2635 38 00


HUMIX ROOTS


FERTILIZANTE LIQUIDO ACONDICIONADOR DE SUELO / ESTIMULANTE DEL DESARROLLO RADICULAR

Es un fertilizante líquido de uso radicular liquido elaborado a partir de ácidos húmicos fúlvicos y algas marinas, presenta además un contenido balanceado de fitohormonas naturales, carbohidratos y vitaminas, elementos que contribuyen a estimular el desarrollo de raíces. Además actúa como un acondicionador edáfico mejorando la actividad microbiológica de la rizosfera permitiendo mejorar la disponibilidad de nutrientes de la solución de suelo. Actúa en el metabolismo de la planta, activando y equilibrando funciones biológicas a nivel celular, favoreciendo el desarrollo de raicillas y mejorando el establecimiento de los cultivos en sus primeras etapas, actúa como reactivador de sistemas radiculares deprimidos o en condiciones de estrés.

COMPOSICIÓN

Potasio(K2O)	1,5% p/v
Extracto Húmico total	10% p/v
Aminoácidos Totales	
Extracto de Algas	
gu	









Elaborado por INVESTA CHILE SPA

Parcela 18 LT-DU Baracaldo María Pinto. Fono + 56 9 814 92 178

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

CULTIVO	L/HA	N° APLIC	OBSERVACIONES
Parronales, Vid	20 - 40	3	1a inicio de flush radicular, 2a fruta cuajada 3a inicio de pinta.
Almendro, Avellano, Castaño, Cerezo, Ciruelo, Damasco, Duraz- nero, Guindo, Nectarino, Nogal	30 - 40	3	Iniciar con brote de 5 a 10 cm. Cada 15 días.
Clementina, Limonero, Mandarino, Naranjo, Olivo, Palto, Papayo, Pomelo	30 a 50	2 a 4	Inicio de temporada, post cuaja.
Arándano, Frambuesa, Frutilla, Mora	8-10	2 a 4	Aplicar con brote activo desde floración cada 10 a 15 días.
Acelga, Achicoria, Ají, Ajo, Alcacho- fa, Alcayota, Apio, Berro, Berenje- na, Betarraga, Brócoli, Cebolla, Coliflor, Chalota, Choclo, Espinaca, Melón, Lechuga, Pepino, Pimiento, Repollo, Sandía, Zapallo italiano, Zanahoria	20 - 40	2 a 3	Desde 6 hojas verdaderas, cada 6 a 10 días.
Alcachofa, Camote, Papa, Pimentón, Tabaco, Tomate.	30 - 40	2 a 3	Desde 6 a 8 hojas verdaderas, cada 6 a 10 días.
Arveja, Alfalfa, Avena, Centeno, Frejol, Garbanzo, Haba, Lupino, Maíz, Poroto, Raps, Sorgo, Soya, Trigo, Triticale.	20 - 30	2 a 3	Desde 6 a 8 hojas verdaderas, cada 6 a 10 días.
Remolacha	30 - 60	2 a 3	Desde 8 a 10 hojas verdaderas, cada 6 a 10 días.
Forestales, Eucalipto , Pino	30 - 60	1 a 3	Aplicar desde brote de 20 cm cada 10 días.
Ornamentales, Clavel, Crisantemo, Gladiolo, Gerbera, hortensia Lilium, Rosa	20 - 30	1 a 2	Aplicar previo a floración, cada 6 a 10 días.

COMPOSICION FÍSICO QUÍMICA

Solubilidad 20C° 100% PH 20C° agua destilada en dilución 0,1% = 7,6 Densidad a 20 °C = 1.0012

Lote Fabricación:

Fecha de vencimiento:

Contenido Neto:

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR





















